



Consejos (o decálogo) para una siembra exitosa.

- 1.- Es necesario conocer bien su terreno, que textura tiene (arenoso, arcilloso), fertilidad, acidez, cantidad de lluvia al año.
- 2.- Conociendo estas características podrá elegir la semilla del pasto que mejor se adapte a su terreno.
- 3.- Realice la preparación del suelo con suficiente tiempo, si mecaniza incluya, arado y dos pasos de rastra.
- 4.- Siembra al comienzo de la época de lluvias, o cuando haya suficiente humedad en el suelo.
- 5.- Utilice la cantidad de semilla y el método de siembra que le recomiende su asesor técnico de Semillas Papalotla.
- 6.- La semilla no debe quedar a más de 2 cm de profundidad. Si la siembra muy profunda puede no emerger. Proteja la semilla contra hormigas y otros insectos.
- 7.- Controle malezas durante los primeros 30 a 40 días después de sembrada.
- 8.- Entre 90 a 120 días después de la siembra, se debe dar el primer pastoreo que debe ser ligero.
- 9.- Siempre permita que su pradera se recupere después del pastoreo, darle un descanso adecuado le permitirá mantenerla en optimas condiciones.
- 10.- Si sigue estos pasos, Felicidades!, usted contará con una excelente pradera y un forraje de muy buena calidad para que consuman sus animales .

Calidad de la semilla de pastos tropicales

Al comprar semilla de pastos es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Toda etiqueta de en los sacos de semilla debe contener los siguientes conceptos.

Pureza física: Es el porcentaje de semillas libre de impurezas, como son semillas vanas, tierra, malezas, otras especies, etc.

Germinación: Son las semillas vivas capaces de germinar y dar origen a una plantas sanas y vigorosas.

Valor Cultural (V. C.) Es el porcentaje de semillas pura viva germinable Esta determina la cantidad de semilla necesaria para sembrar un pradera.
El valor cultural se calcula de la siguiente manera

$$\text{V.C.} = \frac{\text{Pureza Física X Germinación}}{100}$$

Ejemplo : si tenemos una semilla que tenga 95 % de pureza y 80 % de germinación su valor cultural será de:

$$\text{V.C.} = \frac{95 \times 80}{100} = 76 \%$$

Densidad de siembra: Cantidad de semilla necesaria para establecer con éxito una hectárea de pastos.

Consejos prácticos para el mejor manejo de su pradera

Existen tres conceptos básicos para tener un buen manejo de nuestra pradera, y que nos permita mantenerla por largo tiempo en buenas condiciones

Tiempo de ocupación: Es el tiempo que pastará el ganado en una superficie de pradera determinada, procurando que los animales no consuman los rebrotes de los primeros cortes. Esto ocurre después de 4 días de pastoreo.

Tiempo de descanso: Tiempo requerido por la pradera para recuperarse y estar lista para el siguiente pastoreo. El tiempo varía según la especie, época del año y tipo de explotación

Carga animal: Utilizar siembre el numero de animales por hectárea adecuados, esto dependendera del la época del año, el tipo de pasto y su estado de crecimiento.

La fertilización en los programas de manejo de praderas es la práctica que a corto plazo produce los mejores resultados:

Las principales ventajas de su uso son:

Aumenta la cantidad y calidad del forraje nos permite incrementar la carga animal y la productividad por unidad de superficie.

SEMILLAS PAPALOTLA

ORIZABA 195, COL. ROMA MÉXICO D.F. 06700, MÉXICO

T: (55) 5265-9870

F: (55) 5265-9871

Skype: semillas_papalotla

EN MÉXICO

Lada sin costo: 01 800-701-1530

<http://www.grupopapalotla.com>

Correos de nuestros técnicos

MVZ. BRAVO S. abravo@grupopapalotla.com

ING. TORRES J. vhtorres@grupopapalotla.com

MVZ. PACHECO F. jpacheco@grupopapalotla.com